

u être décrits : hémolyse et
e Lasthenie de Ferjol où le

mentale

sociés

ements caractéristiques

ucopénie 22-34% . Jusqu' à 75% des
ents hospitalisés

eutropénie fréquente (17-38%)

mphopénie fréquente (12%)

hrombopénie rare (5-10%)

cellule normale

em. Plusieurs lignées sont atteintes.

minution des cellules hématopoïétiques

trophie des cellules graisseuses, dépôts de
stance

orphe : acide hyaluronique (myélogramme ou
M)

ontinuum entre **hypoplasie** et **aplasie**

cellulaire.

ncycytopenie

ellules pycnotiques, non

tifiables, au sein d'un matériel grisâtre ou
ngé.

disparition des espaces graisseux,

conservation du tissu osseux.

sera transfusée à 6
mois. La dégradation
d'équipe, en mai 2012
dans un service de
2011. L'évolution
contenant assorti
entérale ont été mi
hyperactivité physi
« sauts-danse » da
pour fonction une l
au syndrome post-
permis un arrêt pro
de l' hémoglobine a
globulaire, jusqu'à
Mai 2012, soit 12 m
parfaitement norm
constaté. Parallèle
bien qu'encore pré
brutale, est normo
profonde. Un méla
positive). Le bilan
coloscopie (réalisé
négatif. Les exam
recherche d'un sai
particularité. Les c